

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL DE PACIENTES FUMANTES CADASTRADOS EM UMA USF DE UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO

Luana Marques Silva Barreto*

Diego Cardoso Amaral**

Geizelle de Andrade Sampaio***

Edmar José Borges Santana****

O tabagismo é um fator de risco para inúmeras doenças, sendo muito importante a eliminação do vício de fumar para melhorar os indicadores da saúde pública. Os malefícios gerados pelo tabaco representam um dos piores inimigos para a saúde da população em geral. Na odontologia o tabagismo está associado como fator de risco para o câncer bucal maior severidade e incidência da doença periodontal e menos ganho de inserção após terapia periodontal. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar a condição periodontal em pacientes fumantes atendidos na estratégia de saúde da família de um município do recôncavo baiano. Como objetivo específico traçar o perfil sócio epidemiológico e clínico dos pacientes fumantes cadastrados na USF e verificar os impactos do tabaco na condição periodontal dos mesmos. É um estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Saúde da Família São Paulo, localizada no bairro São Paulo no município de Santo Antonio de Jesus, na região do recôncavo baiano. O estudo foi realizado em pacientes atendidos na USF. Os critérios de inclusão que foram selecionados para o estudo: paciente da referida USF, pacientes fumantes, ter idade superior a 18 anos e os que concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão: os que não compareceram nos dias da pesquisa menores de 18 anos, os não fumantes e os que não concordaram em assinar o termo. Para realizar a avaliação da condição periodontal, foi utilizado o índice periodontal comunitário (CPI). Como resultados parciais, pode-se observar que no universo de pacientes examinados o código mais prevalente foi o de número 4 (bolsa de 6mm ou mais, área preta da sonda apresenta-se dentro da bolsa). Observado em 7 pacientes de um total de 11 pacientes. Com isso observou-se que pacientes fumantes tem maior probabilidade de adquirir doença periodontal.

Palavras-chave: Tabagismo. Higiene bucal. Fumantes. Doença periodontal. Estratégia de saúde da família.

* Graduanda do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza.

** Graduando do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza.

*** Graduando do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza.

**** Docente da Faculdade Maria Milza.