

## FATORES ASSOCIADOS À PRESENÇA DE CÁRIE EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO

Hellen Catarinne Pereira dos Santos de Santana\*

Nalize de Castro Mello\*

Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira\*\*

Larissa Rolim Borges-Paluch\*\*\*

A cárie dentária é uma doença multifatorial, infectocontagiosa e transmissível, causada pela fermentação de bactérias bucais, principalmente o *Streptococcus mutans*. A sua multifatorialidade advém de fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos. Apesar de ser considerada uma doença de fácil prevenção, a cárie continua sendo bastante prevalente no país, tratando-se, portanto de um problema de saúde pública. Desta forma, torna-se imprescindível o estudo de cada população através de levantamentos epidemiológicos, a fim de promover ações resolutas em saúde bucal para a sociedade brasileira. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de fatores de risco com a presença de cárie em escolares do ensino fundamental de um município do Recôncavo Baiano e como objetivos específicos: descrever o perfil dos escolares e relacionar os fatores demográficos, comportamentais e socioeconômicos com a ocorrência da cárie nesses escolares. O estudo possuiu natureza descritiva com abordagem quantitativa. Os participantes do estudo foram os estudantes e os pais/responsáveis dos mesmos. A coleta dos dados aconteceu no município de Governador Mangabeira – BA, em dois momentos, primeiro ocorreu com o envio de um questionário com perguntas referentes aos fatores socioeconômicos, hábitos alimentares e de higiene oral do escolar para os responsáveis dos escolares e no segundo foi realizada a avaliação da cavidade bucal dos estudantes selecionados, seguindo os critérios padronizados pela Organização Mundial da Saúde. Foi realizada a mensuração da experiência de cárie dentária pelos índices de dentes cariados, perdidos ou obturados (CPO-D e CEO-D). Dos 252 escolares participantes do estudo 130 (51,6%) possuíam cárie, e dentre estes pode se observar relação estatística significativa com os fatores cor/raça negra, uso dentifrício sem flúor e baixa escolaridade dos pais com a ocorrência de cárie. Conclui-se, portanto, que há relação da ocorrência de cárie com diversos fatores (demográfico, comportamental e socioeconômico) sendo necessária a priorização de medidas educativas em saúde bucal na população estudada.

**Palavras-chave:** Cárie Dental. Epidemiologia. Saúde Bucal.

---

\*Graduandas do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. E-mail: hellencatarinne@gmail.com, nalizemello1995@gmail.com.

\*\*Odontopediatra, Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM), docente da FAMAM. E-mail: aninhacravo@yahoo.com.br.

\*\*\*Doutora em Ciências Biológicas (UFPR), docente da Graduação e do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (FAMAM). E-mail: larissapaluch@gmail.com.