

## IMPACTO DA OCORRÊNCIA E GRAVIDADE DA PERIODONTITE NA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL

Matheus Fiuza de Almeida\*

Ingrynd Rayanna Vieira de Jesus\*

Bartolomeu Conceição Bastos Neto\*

Johelle de Santana Passos-Soares\*\*

Lilia Paula de Souza Santos\*\*\*

Problemas de saúde bucal têm sido cada vez mais reconhecidos como fatores importantes que causam impacto na qualidade de vida. Instrumentos sociodontais são utilizados para obtenção deste impacto e juntamente com a avaliação clínica são importantes fontes de conhecimento para o planejamento e a implementação de políticas públicas de saúde que possibilitem a intervenção de forma positiva. O objetivo deste trabalho foi investigar a associação entre a ocorrência e a gravidade da periodontite e o seu impacto na qualidade de vida relacionada a saúde bucal. Para isto foi realizado um estudo transversal com 306 indivíduos acima dos 18 anos. O impacto na qualidade de vida foi mensurado pelo OHIP-14. Foi considerado com periodontite o participante com pelo menos quatro dentes, com um ou mais sítios com profundidade de sondagem  $> 4$  mm, com perda de inserção clínica  $\geq 3$  mm no mesmo sítio e presença de sangramento à sondagem. Quanto à gravidade da periodontite, foram utilizados os critérios propostos pela Academia Americana de Periodontologia. Para fins de análise, os padrões de respostas do questionário OHIP-14 foram dicotomizados em: com impacto (constantemente/sempre) e sem impacto (nunca/raramente/às vezes). Análise multivariada foi realizada utilizando análise de regressão logística não condicional e a Razão de Prevalência e intervalos de confiança a 95% foram obtidos mediante a regressão de Poisson robusta. Os resultados demonstraram que a prevalência do impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi 60,5%, às dimensões do OHIP-14 mais afetadas foram desconforto psicológico (38,2%), dor física (33,3%) e incapacidade psicológica (27,5%). Dos participantes, 41,8% apresentavam periodontite, 1,6% periodontite leve, 41,8% moderada e 41,6% grave. As medidas de associação ajustadas demonstraram que entre os indivíduos com periodontite grave (RP: 1,72; IC95%: 1,00-2,98) a prevalência do impacto na qualidade de vida foi 72% maior que entre aqueles sem a doença. Conclui-se que a ocorrência de periodontite grave parece ser um fator independente associado à qualidade de vida relacionada à saúde bucal.

**Palavras-chave:** Qualidade de vida; Saúde bucal; Doenças periodontais.

---

\*Graduandos do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. E-mail: fiuzamatheus@hotmail.com; ingrynd\_vieira@hotmail.com; bbastosneto@hotmail.com.

\*\* Doutora em Saúde Pública. Docente da Universidade Federal da Bahia. E-mail: johpassos@gmail.com.

\*\*\*Mestra em Saúde Coletiva. Docente do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. E-mail: lilia\_paula@yahoo.com.br.